

## ***Tradescantia x andersoniana* (Dreimasterblume)**

*Commelinaceae* - Commelinagewächse | LB: Fr2-3, WR3-4 so | sommergrün

Langblühende Staude mit grasartigen Blätter für Bepflanzungen am Teichrand.

**Herkunft:** Amerika (Tropisches Klima), Arten der Andersoniana-Gruppe sind bei uns gut winterhart.

### **Blatt/Blüte/Frucht:**

Das Blatt hat eine frischgrüne Farbe, ist lanzettlich und ganzrandig, sprich grasartig. Dreizipfelige Schalenblüten mit meist auffälligen Staubblätter; Blüht lange von Juni bis Juli in vielen Blütenfarben je nach Sorte; durch einen Remontierschnitt nach der Blüte kann es zu einer zweiten Blüte im September kommen.

**Lebensform:** Hemikryptophyt                      **Höhe:** 40-70 cm

### **Kulturhinweise:**

Sonnig bis Halbschattig, auf frisch-feuchten und nährstoffreichen Böden, Pflanzung im Frühjahr oder Herbst. Die Dreimasterblume neigt zur Selbstausaat was durch einen Rückschnitt nach der Blüte verhindert werden kann. Eine Teilung der Pflanze im Frühjahr ist möglich. Geringe Kompostgaben im Frühjahr sowie Wassergaben bei langer Trockenheit. Im Herbst Rückschnitt des Laubes.

### **Gestalterische Verwendung:**

Tradescantien eignen sich gut für die Bepflanzung von Teichrändern oder auch in Beeten bzw. als Weingeinfassung. Kombinationen mit Hemerocallis, Blutweiderich, Iris sowie Gräser ergeben ein hübsches Bild. Eine Monopflanzung ist auch möglich.

### **Empfehlenswerte Sorten und weitere Arten:**

*Tradescantia x andersoniana* `Innocence` oder `Gisela` blühen weiß

*Tradescantia x andersoniana* `Leonora` blüht dunkelviolet

*Tradescantia x andersoniana* `Zwanenburg Blue` blüht dunkelviolettblau

### **Geschichte & Geschichten:**

Der Name "Tradescantia" geht auf John Tradescant, einen Naturforscher und Gärtner des 17. Jahrhunderts, zurück, der *Tradescantia virginiana* vor rund 300 Jahren in Europa einführte.